UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI
E DELLE PRODUZIONI VEGETALI

PARCO NATURALE DEL CONERO

GIUNTA REGIONE MARCHE
ASSESSORATO AMBIENTE

POSIZIONE DI FUNZIONE
BIODIVERSITA' E RETE ECOLOGICA REGIONALE

Progetto di rete ecologica della Regione Marche (R.E.M.)

Coordinatore Prof. Edoardo Biondi

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC MONTE CONERO
IT 5320007 (AB25)
(DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000

0 125 250 500
Metri

SISTEMA DI RIEFERIMENTO: GAUSS-BOAGA FUSO EST

AUTORI:
BIONDI Edoardo
CASAVECCHIA Simona
PESARESI Simone
PINZI Morena
BIANCHELLI Maurizio

COORDINATE VERTICI		
	GAUSS-BOAGA FUSO EST	
VERTICI	N	E
NO	4824428	2404063
NE	4824428	2409848
SO	4819296	2404063
SE	4819296	2409848

Rilevamenti cartografici eseguiti negli anni: 2005-2006

QUADRO D'UNIONE
SEZIONI 1:10000





LEGENDA
CARTA DEGLI HABITAT

Habitat prioritari

6110 - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alysso-Sedion albi*
si rinviene nelle radure dell' *Asperulo aristatae-Fumanetum thymifoliae*

6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*notevole fioritura di Orchidee)
comprende i seguenti tipi vegetazionali:
Convolvulo elegantissimi-Brometum erecti
Centaureo bracteatae-Brometum erecti

6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
Convolvulo elegantissimi-Brometum erecti
Coronillo valentinae-Ampelodesmetum mauritanici
Coronillo valentinae-Ampelodesmetum mauritanici var. a *Spartium junceum*

91E0 - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*
(*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)
comprende i seguenti tipi vegetazionali:
Aggr. a Populus nigra o *Pipolus alba* o *Salix alba*
Rubo ulmifolii-Salicetum albae

91AA - Boschi orientali di roverella
comprende i seguenti tipi vegetazionali:
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis

Habitat non prioritari

5210 - Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
Coronillo valentinae-Ampelodesmetum mauritanici var. a *Juniperus oxycedrus*
Spartio junceii-Cytisetum sessilifolii var. a *Juniperus oxycedrus*

5310 - Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*
comprende la seguente tipologia vegetazionale:
Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis var. a *Laurus nobilis*

5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
Coronillo valentinae-Ampelodesmetum mauritanici
Coronillo valentinae-Ampelodesmetum mauritanici var. a *Spartium junceum*

9340 - Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis subass. *lathyretosum veneti*
Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis subass. *cyclaminetosum hederifolii*

Confine SIC

Allestimento cartografico ed elaborazioni GIS (software: ESRI ArcGis 9.0): Simone Pesaresi
Fotointerpretazione e digitalizzazione: Maurizio Bianchelli
Ortofoto utilizzate: Ortofoto COLORE (1998-2000) TERRA ITALY (IT 2000)

Dipartimento Scienze Ambientali e Produzioni Vegetali
Facoltà di Agraria
Università Politecnica delle Marche

Base topografica derivata da CTR 1:10000 Regione MARCHE

STAMPA: Dipartimento Scienze Ambientali e Produzioni Vegetali
Facoltà di Agraria
Università Politecnica delle Marche

ANCONA, 18 DICEMBRE 2007