UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI
E DELLE PRODUZIONI VEGETALI

PARCO NATURALE DEL CONERO

GIUNTA REGIONE MARCHE
ASSESSORATO AMBIENTE

POSIZIONE DI FUNZIONE
*BIODIVERSITA' E RETE ECOLOGICA REGIONALE*

# Progetto di rete ecologica della Regione Marche (R.E.M.)

Coordinatore Prof. Edoardo Biondi

## CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

## SIC PORTONOVO E FALESIA CALCAREA A MARE IT 5320006 (AB 23) (DIRETTIVA 92/43/CEE)

**SCALA 1:10.000**

0 125 250 500
Metri

SISTEMA DI RIEFERIMENTO: GAUSS-BOAGA FUSO EST


**AUTORI:**
BIONDI Edoardo
CASAVECCHIA Simona
PESARESI Simone
PINZI Morena
BIANCHELLI Maurizio


Rilevamenti cartografici eseguiti negli anni: 2005-2006

| COORDINATE VERTICI | | |
|---|---|---|
| | GAUSS-BOAGA FUSO EST | |
| VERTICI | N | E |
| NO | 4825002 | 2405776 |
| NE | 4825002 | 2409533 |
| SO | 4820054 | 2405776 |
| SE | 4820054 | 2409533 |

**QUADRO D'UNIONE SEZIONI 1:10000**







## LEGENDA CARTA DEGLI HABITAT

**Habitat prioritari**

1150 - Lagune costiere
comprende i seguenti tipi vegetazionali:
*Potametum pectinati*
*Charetum hispidae*

6110 - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alysso-Sedion albi*
si rinviene nelle radure dell' *Asperulo aristatae-Fumanetum thymifoliae*

6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*
si rinviene nelle radure del *Coronillo valentinae-Ampelodesmetum mauritanici*

7210 - Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
comprende i seguenti tipi vegetazionali:
*Soncho-Cladietum marisci*
*Scirpo-Phragmitetum*

**Habitat non prioritari**

8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

1160 - Grandi cale e baie poco profonde
comprende la seguente tipologia vegetazionale:
*Zosteretum marinae*

1170 - Scogliere (zona sommersa)
comprende i popolamenti algali

1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine
comprende la seguente tipologia vegetazionale:
*Salsolo kali-Cakiletum maritimae*

1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici
si riferisce all'assoc. *Reichardio maritimae-Brassicetum robertianae* e ai popolamenti della classe *Crithmo-Limonietea* che si rinvengono nella zona emersa delle scogliere

5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
*Coronillo emeroidis-Euphorbietum dendroidis* subass. *ampelodesmetosum mauritanici*
*Coronillo valentinae-Ampelodesmetum mauritanici*

9340 - Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
*Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis* subass. *lathyretosum veneti*
*Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis* subass. *cyclaminetosum hederifolii*

Confine SIC

Allestimento cartografico ed elaborazioni GIS (software: ESRI ArcGis 9.0): Simone Pesaresi
Fotointerpretazione e digitalizzazione: Maurizio Bianchelli
Ortofoto utilizzate: Ortofoto COLORE (1998-2000) TERRA ITALY (IT 2000)

Dipartimento Scienze Ambientali e Produzioni Vegetali
Facoltà di Agraria
Università Politecnica delle Marche

Base topografica derivata da CTR 1:10000 Regione MARCHE


STAMPA: Dipartimento Scienze Ambientali e Produzioni Vegetali
Facoltà di Agraria
Università Politecnica delle Marche

ANCONA, 17 LUGLIO 2007